


Stamm du mercredi 29
janvier 2025 :

les allergies aux piquûres d'abeilles

Notre invité :
le docteur Roland Oppliger,
allergologue à Nyon



Fig 14 : Grade of severity of systemic allergic reactions after Hymenoptera stings



Source : Ulrich R. Mueller, Insect Sting Allergy, Clinical picture, diagnosis and treatment, Gustav Fischer Verlag

Le docteur Oppliger a tenu en haleine son auditoire grâce à ses connaissances scientifiques, ses cas pratiques et également son humour. Il a ensuite répondu aux nombreuses questions posées par nos 30 membres présents à la salle de Signy ce soir-là.

Ayant apporté des seringues d'exercice EpiPen, il a encouragé l'assistance à exercer les gestes d'urgence.

Le schéma utilisé par notre spécialiste insiste sur les 4 types de réactions auxquelles nous devons pouvoir faire face.

Les phases I et II sont les plus courantes et ne doivent pas nous affoler. Il faut vérifier toutefois l'évolution de la réaction.

Les phases III et IV nécessitent la prise en charge rapide par un service médicalisé d'urgence et l'utilisation de la seringue dont chaque apiculteur(trice) devrait être muni(e).



Les seringues EpiPen peuvent être obtenues sur ordonnance chez son généraliste. Elles doivent être renouvelées chaque année.